

# Hilfe bei Deckakt-Zeitpunkt, Progesteron Tabelle Catalyst Progesterone

**1 ng/ml = 3,18 nmol/L**

Bestimmen Sie bei den ersten Anzeichen der Läufigkeit der Basiswert der Progesteron Konzentration.

Wichtig das Verhalten der Hündin zu beobachten, „Steh-Tage“ eingrenzen.  
Vulva wird bis zum Decktermin deutlich angeschwollen und sichtbar, Ausfluss wird vom blutig zum schleimig ändern. Achtung, kann auch bis zum Schluss blutige Ausfluss sein!

Anöstrus Proöstrus	< 1,0 ng/ml (< 3,2 nmol/L)	Nach 2-3 Tagen erneut testen
Vor dem LH Anstieg	1,0 – 1,9 ng/ml (3,2 – 6,3 nmol/L)	Nach 2-3 tagen erneut testen
LH Anstieg	2,0 – 3,0 ng/ml (6,4 – 9,5 nmol/L)	Nach 1-2 Tagen erneut testen
Nach dem LH Anstieg Vor der Ovulation	3,1 – 4,9 ng/ml (9,6 – 15,8 nmol/L)	Nach 1-2 Tagen erneut testen
Um den Zeitpunkt der Ovulation	5,0 – 12,0 ng/ml (15,9 – 38,2 nmol/L)	Decktermin vereinbaren